


p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)

产品编号	产品名称	包装
D2677-1μg	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1μg
D2677-100μg	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	100μg

产品简介:

- p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)是一种碧云天研发的植物表达质粒，可用于表达目的蛋白与Myc标签及YFP (1-155aa)的融合蛋白，并用于双分子荧光互补(Bimolecular fluorescence complementation, BiFC)实验。
- 双分子荧光互补(Bimolecular fluorescence complementation, BiFC)是一种直观、快速可视地判断目的蛋白在活细胞中的定位和相互作用的技术，通常与酵母双杂、Co-IP、Pull-down等实验结果相互验证，具有灵敏度高和实验周期短等的优点。BiFC利用荧光蛋白两个β片层间的环状结构上有多个特异性位点可插入外源蛋白却不影响其荧光活性的特性，将荧光蛋白切割成两个没有荧光活性的分子片段，然后将两个荧光蛋白片段分别与待研究的两个目的蛋白融合表达。当两个目的蛋白发生相互作用时，两个不完整的非荧光片段重新结合或空间上相互靠近，就会重新形成完整的具有活性的荧光蛋白，在激发光的激发下，荧光蛋白发出荧光。反之，若蛋白没有相互作用，则不能被激发出荧光[1]。
- 本质粒含有CMV 35S启动子，可以高效启动目的蛋白在植物细胞中的表达，在多克隆位点根据阅读框插入目的基因A就可以实现其与Myc标签及YFP (1-155aa)的融合表达，在含YFP (156-239aa)的质粒(D2679/D2683/D2695/D2699)的多克隆区插入目的基因B则可实现它们的融合表达。将这两个表达质粒一起共转化植物原生质体，可用于验证目的蛋白A和B的相互作用关系及相互作用的位置[1]；当A和B蛋白发生相互作用时，可以观察到黄色的YFP荧光信号；当A和B蛋白没有发生相互作用时，则观察不到荧光。
- p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒含植物瞬时转染所需元件，不可用于植物稳定遗传株系的构建。
- 本质粒为氨苄青霉素(Ampicillin)抗性。可利用其氨苄青霉素抗性，转化大肠杆菌后筛选阳性克隆。
- 碧云天研发了多对用于BiFC实验的质粒(D2677和D2679、D2681和D2683、D2685和D2687、D2689和D2691、D2693和D2695、D2697和D2699)，可按实验需求选择其中一对或组合(如D2677与D2679/D2683/D2695/D2699，D2679与D2677/D2681/D2693/D2697)，只需简单地将待验证的外源目的基因分别构建到含N段YFP和C段YFP的融合表达质粒上，搭配碧云天的植物原生质体制备与转化试剂盒(C0360)，或者搭配碧云天的植物原生质体分离试剂盒(C0362)与植物原生质体转染试剂盒(C0563)使用，即可快速完成从载体构建到荧光检测，并确认蛋白与蛋白相互作用的实验过程。
- p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒(4371bp)的图谱如下：



- p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒的主要信息如下：

Feature	Nucleotide	Position
AmpR promoter		483-587
AmpR		588-1448

Origin	1619-2207
CAP binding site	2495-2516
CaMV 35S promoter	3133-3478
MCS (Multiple Cloning Sites)	3487-3585
Myc-tag	3586-3618
YFP (1-155aa)	3619-4086
NOS terminator	4103-4355

➤ p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)的多克隆位点的详细图谱如下:

		XbaI	NheI	SpeI
3451	AGGAAGTTCA TTTCATTTGG AGAGAACACG GGGGACTCTA GAGCTAGCAC			
	TCCTTCAAGT AAAGTAAACC TCTCTTGTGC CCCCTGAGAT CTCGATCGTG			
	HpaI SacII BglII AscI BamHI ClaI			
3501	TAGTGTTAAC CCGCGGAGAT CTCGGAGGCC TGGCGCGCCT GGATCCATCG			
	ATCACAATTG GGCGCTCTA GAGCCTCCGG ACCGCGCGGA CCTAGGTAGC			
	Acc65I XmaI			
	SalI XhoI KpnI SmaI Myc-tag			
3551	ATGTCGACCT CGAGAGTACT GGTACCGCTC CCGGGATGGA GCAAAAAGTTG			
	TACAGCTGGA GCTCTCATGA CCATGGCGAG GGCCCTACCT CGTTTTCAAC			
	YFP (1-155aa) sequence			
3601	ATTTCTGAGG AGGATCTTAT GGTGAGCAAG GGCGAGGAGC TGTTCCACCGG			
	TAAAGACTCC TCCTAGAATA CCACTCGTTC CCGCTCCTCG ACAAGTGGCC			
3651	GGTGGTGCCC ATCCTGGTTCG AGCTGGACGG CGACGTAAAC GGCCACAAGT			
	CCACCACGGG TAGGACCAGC TCGACCTGCC GCTGCATTTG CCGGTGTTCA			
3701	TCAGCGTGTC CGGCGAGGGC GAGGGCGATG CCACCTACGG CAAGCTGACC			
	AGTCGCACAG GCCGCTCCCG CTCCCCTAC GGTGGATGCC GTTCGACTGG			
3751	CTGAAGTTCA TCTGCACCAC CGGCAAGCTG CCCGTGCCCT GGCCACCCT			
	GACTTCAAGT AGACGTGGTG GCCGTTTCGAC GGGCACGGGA CCGGGTGGGA			
3801	CGTGACCACC TTCGGCTACG GCCTGCAGTG CTTGCCCCGC TACCCCGACC			
	GCACTGGTGG AAGCCGATGC CGGACGTCAC GAAGCGGGCG ATGGGGCTGG			
3851	ACATGAAGCA GCACGACTTC TTCAAGTCCG CCATGCCCGA AGGCTACGTC			
	TGTACTTCGT CGTGCTGAAG AAGTTCAGGC GGTACGGGCT TCCGATGCAG			
3901	CAGGAGCGCA CCATCTTCTT CAAGGACGAC GGCAACTACA AGACCCGCGC			
	GTCCTCGCGT GGTAGAAGAA GTTCTTGCTG CCGTTGATGT TCTGGGCGCG			
3951	CGAGGTGAAG TTCGAGGGCG ACACCCTGGT GAACCGCATC GAGCTGAAGG			
	GCTCCACTTC AAGCTCCCGC TGTGGGACCA CTTGGCGTAG CTCGACTTCC			
4001	GCATCGACTT CAAGGAGGAC GGCAACATCC TGGGGCACAA GCTGGAGTAC			
	CGTAGCTGAA GTTCTCTCTG CCGTTGTAGG ACCCCGTGTT CGACCTCATG			
	SacI			
4051	AACTACAACA GCCACAACGT CTATATCATG GCCTAAGAGC TCGAATTTCC			
	TTGATGTTGT CGGTGTTGCA GATATAGTAC CGGATTCCTG AGCTTAAAGG			

➤ p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)中没有的酶切位点包括:

AanI	AarI	AbsI	AccB7I	AcvI	AdeI	AfeI
AgeI	AlfI	AloI	Aor51HI	ApaI	AsiGI	AsiSI
AspI	AspA2I	AsuII	AvrII	AxyI	BaeI	BalI
BarI	BbrPI	BbvCI	BclI	BlnI	BlpI	BplI
Bpu10I	Bpu14I	Bpu1102I	BsaAI	Bse21I	BseX3I	BshTI
BsiWI	Bsp68I	Bsp119I	Bsp120I	Bsp1407I	Bsp1720I	BspT104I
BsrGI	BssNAI	Bst1107I	BstAUI	BstBI	BstBAI	BstEII
BstENI	BstPI	BstSNI	BstXI	BstZI	BstZ17I	Bsu36I
BtuMI	CciNI	CelII	CpoI	CsiI	CspI	Csp45I
CspAI	DraIII	EagI	EclXI	Eco47III	Eco52I	Eco72I
Eco81I	Eco91I	Eco105I	EcoNI	EcoO65I	FbaI	FseI
FspAI	I-CeuI	I-PpoI	I-SceI	KflI	Ksp22I	MabI

MlsI	MluI	MluNI	Mox20I	MreI	MroNI	MscI
Msp20I	MssI	NaeI	Nb.BbvCI	Nb.Bpu10I	NgoMIV	NotI
NruI	NspV	Nt.BbvCI	Nt.Bpu10I	PacI	PaqCI	PasI
PdiI	Pfl23II	PflFI	PflMI	PI-PspI	PI-SceI	PinAI
PmaCI	PmeI	PmlI	Ppu21I	PsiI	PspCI	PspEI
PspLI	PspOMI	PspXI	PsyI	RgaI	RigI	RruI
RsrII	Rsr2I	SanDI	SexAI	SfaAI	SfiI	SfuI
SgfI	SgrAI	SgrDI	SmiI	SnaBI	SrfI	SspBI
SwaI	TstI	Tth111I	Van91I	XagI	XcmI	XmaJI

➤ p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)中的单酶切位点包括:

AatII	Acc65I	AflII	AhdI	AlwNI	AscI	BamHI
BanII	BglII	BmgBI	BmtI	BsaBI	BsgI	BsmI
BspDI	BspEI	BspQI	BstAPI	ClaI	Eco53kI	EcoRI
EcoRV	HindIII	HpaI	KasI	KpnI	MauBI	MfeI
NarI	NcoI	NdeI	NheI	NsiI	PaeR7I	PluTI
PshAI	SacI	SacII	Sall	SapI	SbfI	SfoI
SmaI	SpeI	SphI	SspI	StuI	TspMI	XbaI
XhoI	XmaI	ZraI				

➤ p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒对于插入片段进行测序时, 推荐使用p35S forward primer和YFP reverse primer, 它们的序列如下:

p35S forward primer (3357-3381): 5'-CGTCTTCAAAGCAAGTGGATTGATG-3'

YFP reverse primer (3685-3706): 5'-CGCTGAACCTGTGGCCGTTTAC-3'

➤ p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)的全序列信息请参考碧云天的网站上该质粒的信息。

➤ 本质粒与p35S-TP-C-HA-YFP (156-239aa)共转化拟南芥原生质体后的融合蛋白表达效果请参考图1。




图1. 碧云天p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC) (D2677)与p35S-TP-C-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC) (D2695)共转拟南芥原生质体后的融合蛋白表达效果图。在p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)与p35S-TP-C-HA-YFP (156-239aa)质粒上分别连接一对已知的有相互作用的叶绿体蛋白基因*RBDI*和*PsbeE*作为目的基因, 使用植物原生质体制备与转化试剂盒(C0360)制备拟南芥原生质体并共转各10µg重组质粒, 转化完成后将样品平置25°C弱光培养过夜(约16小时), 次日于荧光显微镜下检测YFP荧光信号。上图为实际检测的明场和荧光照片。实际的检测效果会因检测条件的不同而存在差异, 本图仅供参考。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
D2677-1µg	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)	1µg
D2677-100µg	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)	100µg
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存。

注意事项:

- 本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途, 也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 首次使用1µg包装的本产品时, 请先取少量本质粒转染大肠杆菌, 进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的

质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。

2. 100µg包装的本产品质粒浓度为0.5µg/µl。可以直接用于酶切。

参考文献：

1. Hu CD, Chinenov Y, Kerppola TK. Mol Cell. 2002. 9(4):789-98.

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
C0360	植物原生质体制备与转化试剂盒	10次/40次
C0362S	植物原生质体分离试剂盒	5ml×20次
C0563	植物原生质体转染试剂盒	100次/500次
C0268	Protein Endotoxin Removal Kit	200次/1000次
D0026	质粒大量抽提试剂盒	20次
D0028	质粒大量抽提试剂盒(通用型)	20次
D2489	pRD29B-luc (植物报告基因质粒)	1µg/100µg
D2491	pUBI10-GUS (植物报告基因质粒)	1µg/100µg
D2627	p35SPPDK-EGFP-Flag (植物用绿色荧光蛋白)	1µg/100µg
D2675	HA&Myc标签BiFC阳性对照质粒对	各1µg/各100µg
D2677	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2679	p35S-C-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2681	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)-DsRed (for BiFC)	1µg/100µg
D2683	p35S-C-HA-YFP (156-239aa)-DsRed (for BiFC)	1µg/100µg
D2685	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2687	p35S-C-HA-YFP (156-239aa)-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2689	p35S-MCS-Myc-YFP (1-155aa)-MCS (for BiFC)	1µg/100µg
D2691	p35S-MCS-HA-YFP (156-239aa)-MCS (for BiFC)	1µg/100µg
D2693	p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2695	p35S-TP-C-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2697	p35S-N-TP-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1µg/100µg
D2699	p35S-N-TP-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1µg/100µg

Version 2026.03.10