


p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)

产品编号	产品名称	包装
D2693-1μg	p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1μg
D2693-100μg	p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	100μg

产品简介:

- p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)是一种碧云天研发的植物表达质粒，可用于表达目的蛋白与Myc标签及YFP (1-155aa)的融合蛋白，并用于双分子荧光互补(Bimolecular fluorescence complementation, BiFC)实验。
- 双分子荧光互补(Bimolecular fluorescence complementation, BiFC)是一种直观、快速可视地判断目的蛋白在活细胞中的定位和相互作用的技术，通常与酵母双杂、Co-IP、Pull-down等实验结果相互验证，具有灵敏度高和实验周期短等的优点。BiFC利用荧光蛋白两个β片层间的环状结构上有多个特异性位点可插入外源蛋白却不影响其荧光活性的特性，将荧光蛋白切割成两个没有荧光活性的分子片段，然后将两个荧光蛋白片段分别与待研究的两个目的蛋白融合表达。当两个目的蛋白发生相互作用时，两个不完整的非荧光片段重新结合或空间上相互靠近，就会重新形成完整的具有活性的荧光蛋白，在激发光的激发下，荧光蛋白发出荧光。反之，若蛋白没有相互作用，则不能被激发出荧光[1]。
- 本质粒含有CMV 35S启动子和叶绿体的转运肽(Transit peptide, TP)，可以高效启动目的蛋白在植物细胞中的表达并将表达的目的蛋白转运到叶绿体中[2]。在多克隆位点根据阅读框插入目的基因A就可以实现其与Myc标签及YFP (1-155aa)的融合表达，在含YFP (156-239aa)的质粒(D2679/D2683/D2695/D2699)的多克隆区插入目的基因B则可实现它们的融合表达。将这两个表达质粒一起共转化植物原生质体，可用于验证目的蛋白A和B的相互作用关系及相互作用的位置[1]；当A和B蛋白发生相互作用时，可以观察到黄色的YFP荧光信号；当A和B蛋白没有发生相互作用时，则观察不到荧光。
- p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒含植物瞬时转染所需元件，不可用于植物稳定遗传株系的构建。
- 本质粒为氨苄青霉素(Ampicillin)抗性。可利用其氨苄青霉素抗性，转化大肠杆菌后筛选阳性克隆。
- 碧云天研发了多对用于BiFC实验的质粒(D2677和D2679、D2681和D2683、D2685和D2687、D2689和D2691、D2693和D2695、D2697和D2699)，可按实验需求选择其中一对或组合(如D2677与D2679/D2683/D2695/D2699，D2679与D2677/D2681/D2693/D2697)，只需简单地将待验证的外源目的基因分别构建到含N段YFP和C段YFP的融合表达质粒上，搭配碧云天的植物原生质体制备与转化试剂盒(C0360)，或者搭配碧云天的植物原生质体分离试剂盒(C0362)与植物原生质体转染试剂盒(C0563)使用，即可快速完成从载体构建到荧光检测，并确认蛋白与蛋白相互作用的实验过程。
- p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒(4503bp)的图谱如下：



- p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒的主要信息如下：

Feature	Nucleotide	Position
---------	------------	----------

AmpR promoter	483-587
AmpR	588-1448
Origin	1619-2207
CAP binding site	2495-2516
CaMV 35S promoter	3133-3478
TP (Transit Peptide of Chloroplast)	3493-3672
MCS (Multiple Cloning Sites)	3673-3717
Myc-tag	3718-3750
YFP (1-155aa)	3751-4218
NOS terminator	4235-4487

➤ p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)的多克隆位点的详细图谱如下:

		XbaI	Transit Peptide of Chloroplast	
3451	AGGAAGTTCA	<u>TTCATTTGG</u>	AGAGAACACG	GGGGACTCTA <u>GAATGGCTTC</u>
	TCCTTCAAGT	AAAGTAAACC	TCTCTTGTGC	CCCCTGAGAT CTTACCGAAG
3501	<u>CTCTATGCTC</u>	<u>TCTTCCGCTA</u>	<u>CTATGGTTGC</u>	<u>CTCTCCGGCT</u> <u>CAGGCCACTA</u>
	GAGATACGAG	AGAAGGCGAT	GATACCAACG	GAGAGGCCGA GTCCGGTGAT
3551	<u>TGGTCGCTCC</u>	<u>TTTCAACGGA</u>	<u>CTTAAGTCCT</u>	<u>CCGCTGCCTT</u> <u>CCCAGCCACC</u>
	ACCAGCGAGG	AAAGTTGCCT	GAATTCAGGA	GCGGACGGAA GGGTCGGTGG
3601	<u>CGCAAGGCTA</u>	<u>ACAACGACAT</u>	<u>TACTTCCATC</u>	<u>ACAAGCAACG</u> <u>GCGGAAGAGT</u>
	GCGTTCCGAT	TGTTGCTGTA	ATGAAGGTAG	TGTTTCGTTGC CGCCTTCTCA
			BamHI ClaI	SalI XhoI
3651	<u>TAACTGCATG</u>	<u>CAGGTGTGGC</u>	<u>CTGGATCCAT</u>	CGATAGTACT GTCGACCTCG
	ATTGACGTAC	GTCCACACCG	GACCTAGGTA	GCTATCATGA CAGCTGGAGC
	KpnI	XmaI		
	Acc65I	SmaI		Myc-tag
3701	AGGGTACCGC	<u>TCCC</u> <u>GGGATG</u>	<u>GAGCAAAAGT</u>	TGATTTCTGA GGAGGATCTT
	TCCCATGGCG	AGGGCCCTAC	CTCGTTTTCA	ACTAAAGACT CCTCCTAGAA
	<u>YFP(1-155aa) sequence</u>			
3751	ATGGTGAGCA	AGGGCGAGGA	GCTGTTTACC	GGGGTGGTGC CCATCCTGGT
	TACCACTCGT	TCCCCTCCT	CGACAAGTGG	CCCCACCACG GGTAGGACCA
3801	<u>CGAGCTGGAC</u>	GGCGACGTAA	ACGGCCACAA	GTTTCCGCTG TCCGCGGAGG
	GCTCGACCTG	CCGCTGCATT	TGCCGGTGT	CAAGTCGCAC AGGCCGCTCC
3851	GCGAGGGCGA	TGCCACCTAC	GGCAAGCTGA	CCCTGAAAGT CATCTGCACC
	<u>CGCTCCCGCT</u>	<u>ACGGTGGATG</u>	<u>CCGTTTCCGCT</u>	<u>GGGACTTCAA</u> <u>GTAGACGTGG</u>
3901	ACCGGCAAGC	TGCCCGTGCC	CTGGCCCACC	CTCGTGACCA CCTTCGGCTA
	TGGCCGTTTCG	ACGGGCACGG	GACCGGGTGG	GAGCACTGGT GGAAGCCGAT
3951	<u>CGGCCTGCAG</u>	<u>TGCTTCGCCC</u>	<u>GCTACCCCGA</u>	<u>CCACATGAAG</u> <u>CAGCACGACT</u>
	GCCGGACGTC	ACGAAGCGGG	CGATGGGGCT	GGTGTACTTC GTCGTGCTGA
4001	TCTTCAAGTC	CGCCATGCCC	GAAGGCTACG	TCCAGGAGCG CACCATCTTC
	AGAAGTTTTCAG	GCGGTACGGG	CTTCCGATGC	AGTTCCTCGC GTGGTAGAAG
4051	TTCAAGGACG	ACGGCAACTA	CAAGACCCGC	GCCGAGGTGA AGTTCGAGGG
	<u>AAGTTCCCTGC</u>	<u>TGCCGTTGAT</u>	<u>GTTCTGGGCG</u>	<u>CGGCTCCACT</u> <u>TCAAGCTCCC</u>
4101	<u>CGACACCCTG</u>	<u>GTGAACCGCA</u>	<u>TCGAGCTGAA</u>	<u>GGGCATCGAC</u> <u>TTCAAGGAGG</u>
	GCTGTGGGAC	CACTTGGCGT	AGCTCGACTT	CCCGTAGCTG AAGTTCCTCC
4151	<u>ACGGCAACAT</u>	<u>CCTGGGGCAC</u>	<u>AAGCTGGAGT</u>	<u>ACAAC TACAA</u> <u>CAGCCACAAC</u>
	TGCCGTTGTA	GGACCCCGTG	TTCGACCTCA	TGTTGATGTT GTCGGTGTGG
		SacI		NOS terminator
4201	<u>GTCTATATCA</u>	<u>TGGCCTAAGA</u>	<u>GCTCGAATTT</u>	<u>CCCCGATCGT</u> <u>TCAAACATTT</u>
	<u>CAGATATAGT</u>	<u>ACCGGATTCT</u>	<u>CGAGCTTAAA</u>	<u>GGGGCTAGCA</u> <u>AGTTTGTAAA</u>

➤ p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)中没有的酶切位点包括:

AanI	AatI	AccB7I	AcvI	AdeI	AfeI	AgeI
AhII	AlfI	AloI	Aor51HI	Apal	AscI	AsiGI
AsiSI	AspI	AspA2I	AsuII	AsuNHI	AvrII	AxyI

BaeI	BalI	BarI	BbrPI	BbvCI	BclI	BcuI
BglII	BlnI	BlpI	BmtI	BpI	Bpu14I	Bpu1102I
BsaAI	Bse21I	BseX3I	BshTI	BsiWI	Bsp68I	Bsp119I
Bsp120I	Bsp1407I	Bsp1720I	BspOI	BspT104I	BsrGI	BssNAI
Bst1107I	BstAUI	BstBI	BstBAI	BstEII	BstENI	BstPI
BstSNI	BstXI	BstZI	BstZ17I	Bsu36I	BtuMI	CciNI
CelII	Cfr42I	CpoI	CsiI	CspI	Csp45I	CspAI
DraIII	EagI	EclXI	Eco47III	Eco52I	Eco72I	Eco81I
Eco91I	Eco105I	Eco147I	EcoNI	EcoO65I	FbaI	FseI
FspAI	I-CeuI	I-PpoI	I-SceI	KflI	KspI	Ksp22I
MabI	MlsI	MluI	MluNI	Mox20I	MreI	MroNI
MscI	Msp20I	MssI	NaeI	Nb.BbvCI	NgoMIV	NheI
NotI	NruI	NspV	Nt.BbvCI	PacI	PalAI	PasI
PceI	PdiI	Pfl23II	PflFI	PflMI	PI-PspI	PI-SceI
PinAI	PmaCI	PmeI	PmlI	Ppu21I	PsiI	PspCI
PspEI	PspLI	PspOMI	PsyI	RgaI	RigI	RruI
RsrII	Rsr2I	SacII	SanDI	SexAI	SfaAI	SfiI
Sfr303I	SfuI	SgfI	SgrAI	SgrBI	SgrDI	SgsI
SmiI	SnaBI	SpeI	SrfI	SseBI	SspBI	SstII
StuI	SwaI	TstI	Tth111I	Van91I	XagI	XcmI

XmaJI

➢ p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)中的单酶切位点包括:

AatII	AbsI	Acc65I	AhdI	AlwNI	BamHI	BanII
BmgBI	Bpu10I	BsaBI	BsgI	BsmI	BspDI	BspEI
BspQI	BstAPI	BtgI	ClaI	Eco53kI	EcoRI	EcoRV
HindIII	HpaI	KasI	KpnI	MauBI	MfeI	NarI
NcoI	NdeI	NsiI	PaeR7I	PaqCI	PluTI	PspXI
SacI	SalI	SapI	SbfI	SfoI	SmaI	SspI
TspMI	XbaI	XhoI	XmaI	ZraI		

➢ p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)质粒对于插入片段进行测序时, 推荐使用p35S forward primer和YFP reverse primer, 它们的序列如下:

p35S forward primer (3357-3381): 5'-CGTCTTCAAAGCAAGTGGATTGATG-3'

YFP reverse primer (3817-3838): 5'-CGCTGAAGTTGTGGCCGTTTAC-3'

➢ p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)的全序列信息请参考碧云天的网站上该质粒的信息。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
D2693-1μg	p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)	1μg
D2693-100μg	p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa)	100μg
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存。

注意事项:

- 本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途, 也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

- 首次使用1μg包装的本产品时, 请先取少量本质粒转染大肠杆菌, 进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定, 或通过测序进行鉴定。
- 100μg包装的本产品质粒浓度为0.5μg/μl。可以直接用于酶切。

参考文献:

1. Hu CD, Chinenov Y, Kerppola TK. Mol Cell. 2002. 9(4):789-98.

2. Ouyang M, Li X, Zhang J, Feng P, Pu H, K, et al. Cell. 2020. 180(6):1144-1159.e20.

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0360	植物原生质体制备与转化试剂盒	10次/40次
C0362S	植物原生质体分离试剂盒	5ml×20次
C0563	植物原生质体转染试剂盒	100次/500次
C0268	Protein Endotoxin Removal Kit	200次/1000次
D0026	质粒大量抽提试剂盒	20次
D0028	质粒大量抽提试剂盒(通用型)	20次
D2489	pRD29B-luc (植物报告基因质粒)	1μg/100μg
D2491	pUBI10-GUS (植物报告基因质粒)	1μg/100μg
D2627	p35SPPDK-EGFP-Flag (植物用绿色荧光蛋白)	1μg/100μg
D2675	HA&Myc标签BiFC阳性对照质粒对	各1μg/各100μg
D2677	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2679	p35S-C-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2681	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)-DsRed (for BiFC)	1μg/100μg
D2683	p35S-C-HA-YFP (156-239aa)-DsRed (for BiFC)	1μg/100μg
D2685	p35S-C-Myc-YFP (1-155aa)-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2687	p35S-C-HA-YFP (156-239aa)-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2689	p35S-MCS-Myc-YFP (1-155aa)-MCS (for BiFC)	1μg/100μg
D2691	p35S-MCS-HA-YFP (156-239aa)-MCS (for BiFC)	1μg/100μg
D2693	p35S-TP-C-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2695	p35S-TP-C-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2697	p35S-N-TP-Myc-YFP (1-155aa) (for BiFC)	1μg/100μg
D2699	p35S-N-TP-HA-YFP (156-239aa) (for BiFC)	1μg/100μg

Version 2026.03.11